

ソトラシブ＋Pmab(大腸癌)

委員長	申請医
-----	-----

レジメン登録名称／電子カルテ登録名称
ソトラシブ＋Pmab(大腸癌)
ソトラシブ＋Pmab(大腸癌)

作成日
2026/07/05

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
大腸癌	切除不能・再発	14日	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ソトラシブ 960mg/日	経口	day1～14
2	パニツムマブ 6mg/kg	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	②	生食(100mL) パニツムマブ 6mg/kg	点滴	100mL/h:60分
	③	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

※本治療はKRAS(G12C)変異陽性の患者のみ使用可能

調製方法:パニツムマブの用量分を生食100mlから抜き、total 100mlとする。
1回量が1000mgを超える場合は、生食で希釈し150mlにして、90分以上かけて点滴する。

パニツムマブはインラインフィルター0.2又は0.22ミクロンを使用する。

ソトラシブは副作用に応じて減量可能(1段階減量:480mg/日、2段階減量:240mg/日)

ソトラシブ併用薬に関して

- ・BCRP基質となる薬剤(ロスバスタチン、アトルバスタチン、メトトレキサート等)
→ソトラシブとの併用にて血中濃度上昇リスク
- ・胃内PHを上昇させる薬剤(PPI、H2受容体拮抗薬)
→ソトラシブの血中濃度が低下する可能性