

Bmab+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

Bmab+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌)

Bmab+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌)

作成日

2010/02/03

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌	進行再発	21	4~6

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	カルボプラチン(AUC6)	点滴	day1
2	ペトレキセド(500mg/m ²)	点滴	day1
3	ペバシズマブ(15mg/kg)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg) ※アプレピタント併用時はDEXは4.95mg	点滴	200mL/h:30分
	②	ペトレキセド(500mg/m ²) 生食(100mL)	点滴	450mL/h:10分
	③	カルボプラチン(AUC6) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	④	ペバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	⑤	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
維持療法		4~6コース終了後PDが認められていない場合は、PDが認められるまで下記の通りBmab+PEMで投与継続		
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分
	②	ペトレキセド(500mg/m ²) 生食(100mL)	点滴	450mL/h:10分
	③	ペバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	④	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

扁平上皮癌を除いた非小細胞肺癌で使用

メコバラミン注(ビタミンB12)1回1mgを筋注:ペトレキセド初回投与の1週間以上前から9週ごとに投与する。
 パンビタン末®1g(葉酸として0.5mg)を1日1回連日経口投与:ペトレキセド投与の1週間以上前から投与する。
 ビタミンB12・葉酸ともにペトレキセド最終投与日から22日目まで継続する。
 NSAIDsと併用注意(休薬あり)

4~6コース終了後PDが認められていなければ、PDが認められるまでBmab+PEMで投与継続