

Bmab+CBACA+PTX(非小細胞肺癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

Bmab+CBACA+PTX(非小細胞肺癌)

Bmab+CBACA+PTX(非小細胞肺癌)

作成日

2010/02/03

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌		21	4~6

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	パクリタキセル注(200mg/m ²)	点滴	day1
2	カルボプラチン(AUC6)	点滴	day1
3	ペバシズマブ(15mg/kg)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(50mL) デキサメタゾン注(16.5mg) ファモチジン注(20mg) クロルフェニラミン注(5mg)	点滴	200mL/h:15分
	②	グラニセトロン注(3mg/100mL)	点滴	200mL/h:30分
	③	パクリタキセル(200mg/m ²) 5%ブドウ糖液(250~500mL) ※ パクリタキセル 300mg/body以上では5%ブドウ糖液500ml	点滴	手落とし:180分
	④	カルボプラチン(AUC6) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑤	ペバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	⑥	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
維持療法		4~6コース終了後PDが認められていない場合は、PDが認められるまで下記の通りBmab単剤で投与継続		
day1	①	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	②	ペバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL) ※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	③	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

扁平上皮癌を除いた非小細胞肺癌で使用

アプレピタントカプセルを使用する場合もDEXIは同量

パクリタキセル投与時はフィルター付PVCフリーの専用ライン使用

ペバシズマブ投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可

4~6コース終了後PDが認められていなければ、PDが認められるまでペバシズマブ単剤で投与継続