

Bmab+CDDP+PEM(非小細胞肺癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

Bmab+CDDP+PEM(非小細胞肺癌)

Bmab+CDDP+PEM(非小細胞肺癌)

作成日

2015/09/24

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌		21	4~6

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ベバシズマブ(15mg/kg)	点滴	day1
2	シスプラチン(75mg/m ²)	点滴	day1
3	ペトレキセド(500mg/m ²)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	②	生食(500mL) 硫酸Mg補正液 1mEq/ml(20mL)	点滴	250mL/h:120分
	③	パロノセトロン塩酸塩点滴静注バック(0.75mg/50ml) デキサメタゾン注(9.9mg)	点滴	100mL/h:30分
	④	ベバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL)	点滴	67mL/h:90分
		※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可		
	⑤	ペトレキセド(500mg/m ²) 生食(100mL)	点滴	500mL/h:12分
	⑥	生食(100mL)	点滴	200mL/h:30分
	⑦	シスプラチン(75mg/m ²) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑧	フロセミド注(10mg)	静注	
	⑨	ソリアセトF®(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑩	D-マンニトール20%(300mL)	側管点滴	150mL/h:120分
	⑪	ソリアセトF®(500mL)×3	点滴	330mL/h:90分
day2、3	①	ソリアセトF®(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	②	生食(100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分
	③	ソリアセトF®(500mL)×3	点滴	250mL/h:120分
維持療法		4~6コース終了後PDが認められていない場合は、PDが認められるまで下記の通りBmab+PEMで投与継続		
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分
	②	ペトレキセド(500mg/m ²) 生食(100mL)	点滴	450mL/h:10分
	③	ベバシズマブ(15mg/kg) 生食(100mL)	点滴	67mL/h:90分
		※投与時間 初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可		
	④	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

扁平上皮癌を除いた非小細胞肺癌で使用

day1～3 アプレピタントカプセル併用。

メコバラミン注(ビタミンB12)1回1mgを筋注:ペムトレキセド初回投与の1週間以上前から9週ごとに投与する。

パンビタン末®1g(葉酸として0.5mg)を1日1回連日経口投与:ペムトレキセド投与の1週間以上前から投与する。

ビタミンB12・葉酸ともにペムトレキセド最終投与日から22日目まで継続する。

NSAIDsと併用注意(休薬あり)

4～6コース終了後PDが認められていなければ、PDが認められるまでBmab+PEMで投与継続