

Bmab+FOLFIRI(大腸癌)

委員長	申請医
-----	-----

レジメン登録名称／電子カルテ登録名称
Bmab+FOLFIRI(大腸癌)
Bmab+FOLFIRI(大腸癌)

作成日
2008/07/31

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
大腸癌		14	until PD

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ベバシズマブ(5mg/kg)	点滴	day1
2	イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> )	点滴	day1
3	レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> )	点滴	day1
4	フルオロウラシル(400mg/m <sup>2</sup> )	点滴	day1
5	フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> )	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(20mL)	静注	
	②	グラニセトン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg) ファモチジン注(20mg)  ※アプレピタント併用時はDEXIは4.95mg	点滴	200mL/h:30分
	③	ベバシズマブ(5mg/kg) 生食(100mL)  ※初回90分(66ml/h) 2回目60分(100ml/h) 3回目以降30分(200ml/h)へ変更可	点滴	67mL/h:90分
	④	イリノテカン(150mg/m <sup>2</sup> ) 生食(250mL)	点滴	166mL/h:90分
	⑤	レボホリナート(200mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液(250mL) ④,⑤は同時に落とす。	点滴	125mL/h:120分
	⑥	フルオロウラシル(400mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液(100mL)	点滴	450mL/h:15分
	⑦	フルオロウラシル(2400mg/m <sup>2</sup> ) 生食(1000mL)	点滴	23mL/h:46時間
	⑧	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分
	⑨	ヘパリンNaロック(ヘパフラッシュ)		

備考

--