

CBDCA+nabPTX(非小細胞肺癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

CBDCA+nabPTX(非小細胞肺癌)

CBDCA+nabPTX(非小細胞肺癌)

作成日

2015/10/14

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌		21	6

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> )	点滴	day1、8、15
2	カルボプラチン(AUC6)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	パロノセトロン塩酸塩点滴静注バック(0.75mg/50ml) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	100mL/h:30分
	②	生食(50mL)	点滴	前後フラッシュ
	③	ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食(100mL)	点滴	手落とし:30分
	④	生食(50mL)	点滴	前後フラッシュ
	⑤	カルボプラチン(AUC6) 生食(250mL)	点滴	125mL/h:120分
			※初回は2時間(125ml/h)で投与、2回目以降は1時間(250ml/h) へ短縮可(適宜調整)	
day8、15	①	グラニセトロン注(3mg/100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分
	②	生食(50mL)	点滴	前後フラッシュ
	③	ナブパクリタキセル(100mg/m <sup>2</sup> ) 生食(100mL)	点滴	手落とし:30分
	④	生食(50mL)	点滴	前後フラッシュ

備考

- ・ラインはPVCフリーのものでなくてOK
- ・ナブパクリタキセル投与前後は生食でフラッシュ
- ・調整は20G針で可(18G針推奨しているが…)
- ・ナブパクリタキセルは血液製剤です。