

CBDCA+PEM(非小細胞肺癌)

委員長

申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

CBDCA+PEM(非小細胞肺癌)

CBDCA+PEM(非小細胞肺癌)

作成日

2010/02/03

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
非小細胞肺癌		21	4~6

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	ペトレキセド(500mg/m ²)	点滴	day1
2	カルボプラチン(AUC6)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	グラニセトロン注(3mg/100ml) デキサメタゾン注(6.6mg) ※アプレピタント併用時はDEXIは4.95mg	点滴	200mL/h:30分
	②	ペトレキセド(500mg/m ²) 生食(100mL)	点滴	450mL/h:10分
	③	カルボプラチン(AUC6) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	④	生食(50mL)	点滴	200mL/h:15分

備考

扁平上皮癌を除いた非小細胞肺癌で使用

メコバラミン注(ビタミンB12)1回1mgを筋注:ペトレキセド初回投与の1週間以上前から9週ごとに投与する。
パンピタン末®1g(葉酸として0.5mg)を1日1回連日経口投与:ペトレキセド投与の1週間以上前から投与する。
ビタミンB12・葉酸ともにペトレキセド最終投与日から22日目まで継続する。
NSAIDsと併用注意(休薬あり)