

CDDP+PEM(悪性胸膜中皮腫)

委員長 申請医

レジメン登録名称/電子カルテ登録名称

CDDP+PEM(悪性胸膜中皮腫)

CDDP+PEM(悪性胸膜中皮腫)

作成日

2014/08/28

適応病名	適応分類	1コースの日数	総コース回数
悪性胸膜中皮腫		21	4

番号	抗がん剤名	投与方法	投与日
1	シスプラチン(75mg/m ²)	点滴	day1
2	ペトレキセド(500mg/m ²)	点滴	day1

投与日	Rp	薬品名 用量 コメント	投与方法	投与速度
day1	①	生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	②	生食(500mL) 硫酸Mg補正液 1mEq/ml(20ml)	点滴	250mL/h:120分
	③	パロノセトロン塩酸塩点滴静注バック(0.75mg/50ml) デキサメタゾン注(9.9mg)	点滴	100mL/h:30分
	④	ペトレキセド(500mg/m ²) 生食(100mL) ※ペトレキセド投与後30分間隔をあげてシスプラチンを投与	点滴	450mL/h:15分
	⑤	ソリター-T1輸液®(200mL)	点滴	400ml/h:30分
	⑥	シスプラチン(75mg/m ²) 生食(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑦	フロセミド注(10mg)	静注	
	⑧	ソルアセトF®(500mL)	点滴	250mL/h:120分
	⑨	D-マンニトール20%(300mL)	側管点滴	150mL/h:120分
	⑩	ソルアセトF®(500mL) × 3本	点滴	330mL/h:90分
day2、3	①	ソルアセトF®(500mL) × 4本	点滴	250mL/h:120分
	②	生食(100mL) デキサメタゾン注(6.6mg)	点滴	200mL/h:30分

備考

・day1~3 アプレピタントカプセル併用。

- ・メコバラミン注(ビタミンB12)1回1mgを筋注:ペトレキセド初回投与の1週間以上前から9週ごとに投与する。
- ・パンピタン末1g®(葉酸として0.5mg)を1日1回連日経口投与:ペトレキセド投与の1週間以上前から投与する。
- ・ビタミンB12・葉酸ともにペトレキセド最終投与日から22日目まで継続する。
- ・NSAIDsと併用注意(休薬あり)。